PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA COMARCA DE MONTERREI (OURENSE)

Rafael Castro Vaamonde

Ingeniero Agrónomo

ÍNDICE

ÍNDICE 2
INTRODUCCIÓN 4
DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 4
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 4
FISIOGRAFÍA. 5
HIDROGRAFÍA. 5
CLIMA. 6
CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTOS 7
PASTOS HERBÁCEOS 7
Prados de siega de baja altitud. 7
Prados de siega de montaña 8
Prados xeromesofíticos 8
Pastizales de alta montaña 8
PASTOS ARBUSTIVOS 9
Brezales secos europeos 9
Brezales húmedos 10
PASTOREO Y MANEJO DE PASTIZALES 10
ORGANIZACIÓN SOCIAL TRADICIONAL 10
ORDENACIÓN SILVOPASTORAL 12
MANIFESTACIONES ASOCIADAS A LA CULTURA GANADERA. 14
El Entroido 14
Otras manifestaciones culturales 15
MANEJO DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL PASTIZAL 16
CURIOSIDADES Y VARIANTES DEL SISTEMA. 16
CULTIVOS FORRAJEROS 17
RAZAS AUTÓCTONAS 17
RUBIA GALLEGA. 18
MORENAS 19

Limiá *19*

Cachena *19*

Caldelá *20*

Frieiresa *21*

Vianesa *21*

EXPLOTACIONES EN LA ACTUALIDAD *21*

TABLAS *23*

ILUSTRACIONES *26*

PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA COMARCA DE MONTERREI (OURENSE)

INTRODUCCIÓN

Se tiene constancia de la cría de vacuno en Galicia hace ya más de 3.700 años. Durante este periodo se han seleccionado varias razas con buenas aptitudes para la producción de carne y leche, el trabajo y que además poseen una gran rusticidad y adaptación al medio. En ese mismo tiempo se ha forjado una cultura ganadera y una organización social y económica que han pervivido casi inalteradas hasta la mitad del siglo pasado.

Las razas autóctonas gallegas son además de la bien conocida y ya explotada en numerosos países Rubia Gallega, las conocidas como Morenas Gallegas: Cachena, Vianesa, Frieiresa, Caldelá y Limiá que estuvieron al borde de su extinción pero que están en la actualidad siendo recuperadas por sus cualidades productivas y de adaptación al medio.

Se estudiará el sistema ganadero tradicional en la comarca de Monterrei situada en las montañas del interior de Galicia, provincia de Ourense donde se trabaja en la recuperación de razas bovinas en peligro de extinción para su explotación ecológica en régimen extensivo.

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

La Comarca de Monterrei engloba los Ayuntamientos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei Oímbra, Riós, Verín y Vilardevós, incluyendo los municipios conocidos como “As Frieiras”, A Gudiña y A Mezquita en determinados ámbitos (Partido Judicial, GDR 13 Leader 2007-2013…). Cuenta con una población de 31.537 habitantes distribuidos en una superficie de 1.282,80 Km/2 en 191 núcleos de población.

Este territorio se encuentra situado al Sur-Este de la Provincia de Ourense, limitando al sur con Portugal, al este con la comarca de Viana, norte con la comarca de Terra de Caldelas y al Oeste con la comarca de A Limia.

Caracterizan el territorio un alto número de entidades de población, dispersas y de reducido tamaño.

FISIOGRAFÍA.

Los materiales que predominan en este espacio son los granitos, las pizarras y los sedimentos. Estos últimos los encontramos principalmente en el Valle del Támega, formados por la acción de modelaje de este río a lo largo de los tiempos. Tomando este valle como referencia encontraríamos los granitos hacia el Oeste y el Norte y las pizarras hacia el Este.

Las principales unidades de relieve del territorio son:

La *Serra del Larouco*, en el Oeste, haciendo frontera con la comarca de A Limia extendiéndose de Sur a Norte con cotas entre 800-1000 m.s.n.m.

Hacia el Norte tenemos el Macizo Central, más concretamente a su límite Sur: las Sierras de *San Mamede* y los *Montes del Invernadoiro* con cotas entre 1.000 y 1.500 m.s.n.m.

La *Serra del Fial de las Corzas* se ramifica en las proximidades del alto de Fumaces en pequeñas alineaciones montañosas entre las que sobresale la *Serra de las Penas Ceibes*, con picos de altitud comprendidos entre 800 y 1.100 m.s.n.m. en el Este de Vilardevós, cambiando la dirección Norte-Sur por la de Noroeste-Suroeste.

Más hacia el Este, en A Mezquita y en A Gudiña el relieve presenta poco contraste entre las zonas más altas y más bajas, destacando las superficies levemente allanadas debido a los cursos fluviales.

El otro elemento destacable del relieve es la depresión de Verín o Valle del Támega, espacio llano con altitudes comprendidas entre los 390 y 700 m.m.n.m.

HIDROGRAFÍA.

La abundancia de precipitaciones en las zonas altas unida a lo accidentado de la topografía da lugar a una densísima red de ríos y arroyos.

La red hidrográfica pertenece a la cuenca del Duero, a excepción de ciertos cursos afluentes del Limia en el Ayuntamiento de Cualedro y otros sitios en las estribaciones norte que llegan al Sil.

Entre los ríos más importantes tenemos que hablar del Támega, que nace en las proximidades de la Alberguería, en Laza, y recorre 51 Km de Norte a Sur antes de traspasar la frontera con Portugal donde muere en el Duero. Su afluente más destacable es el Búbal.

Otro río importante por su caudal es el Camba, que nace en el Fial de las Corzas y baña la mitad oriental del Ayuntamiento de Castrelo do Val y el Norte del de A Gudiña, para después unir sus aguas a las del Bibei.

El río Mente nace entre los lugares de Pedroso y Cortegada, en el Ayuntamiento de Riós y discurre hacia el Sur para desembocar ya en territorio portugués en el río Rabazal. Otro río a destacar en esta zona es el Arzoá.

CLIMA.

Para dar una definición general del clima dentro del territorio objeto de este estudio habría que hablar de la contraposición entre el dominio climático oceánico continental con características mediterráneas en la depresión de Verín y un dominio oceánico continental de montaña en el resto.

Este carácter transicional entre regiones climáticas y su complejo relieve le da al clima una notable variedad, dándose la existencia de diversos microclimas en áreas reducidas.

Los veranos son calurosos y secos, denotando su carácter parcialmente mediterráneo, con máximas de hasta 36 ºC, y los inviernos bastante fríos, con mínimas que pueden llegar a los -7 ºC. La pluviometría oscila entre los 800 mm anuales en las zonas más bajas a 390 m.s.n.m. en el límite sur del valle y los 2.500 alcanzados en puntos de los montes de O Invernadeiro a unos 1.500 m.s.n.m.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTOS

El carácter de transición entre regiones climáticas del territorio y su diversidad topográfica generan una gran variedad de hábitats.

PASTOS HERBÁCEOS.

Se describen los principales tipos de pastos por orden de importancia en la comarca:

Prados de siega de baja altitud.

Prados mesofíticos ricos en especies, sobre suelos silíceos profundos y llanos, pertenecen a la Clase Molinio-Arrhenatheretea, Orden Arrhenatheretalia, Alianza Cynosurion cristati. Estos prados extensivos son ricos en especies de floración aparente y se suelen segar una o dos veces al año, una vez florecidas las gramíneas.

En el territorio de estudio se encuentran estos prados en el valle del támega y en las riberas de los otros cursos fluviales en altitudes entre los 390 y los 600 m.s.n.m. Debido a la leve sequía estival precisan ser irrigados bien por los cursos naturales bien mediante una densa red de canales.

Ocupan terrenos de bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*) o más raramente de robledales galaico-portugueses con *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica.*

Podemos definirlos como seminaturales pues precisan de la acción continua del hombre mediante su aprovechamiento y riego para mantenerse. En caso de abandono son rápidamente invadidos por especies arbóreas y arbustivas siendo el terreno recuperado por el bosque de ribera en un periodo sorprendentemente corto.

Son formaciones herbáceas densas con cobertura del 100% y altura que alcanza los 80-100 cm. Aparecen gramíneas y leguminosas siendo las especies más destacadas: *Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosus, Bellis perennis,Bromus hordeaceus, Cardamine pratensis, Cerastium vulgare, Crepis capillaris, Cynosusus cristatus, Dactylis glomerata, Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, Lolium perenne, Linum bienne, Lotus pedunculatus, Malva moschata, Medicago sativa, Plantago lanceolata, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus minor,Trifolium dubium,Trifolium pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens*.

Prados de siega de montaña

Prados mesofíticos que se extienden también por las riberas de ríos y arroyos pero en zonas de más altitud ocupando suelos ácidos en terrenos de los pisos de montano a subalpino.

Sus características son similares a las de los prados de siega del valle, pertenecen a la Clase Molinio-Arrhenatheretea, Orden Arrhenatheretalia, *Alianza Arrhenatherion,* As. *Malvo Moschatae-Arrhenatheretum Bulbosi* siendo las especies indicadoras: *Alchemilla spp., Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Arnica montana, Astrantia major, Bellis perennis, Bromus hordeaceus, Chaerophyllum hirsutum, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Lolium perenne, Malva moschata, Narcissus asturiensis, N. pseudonarcisus subsp. nobilis, Plantago lanceolata, Pimpinella major, Polygonum bistorta, Primula elatior, Rhinantus minor, Silene dioica, Silene vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium dubium, Trisetum flavescens.*

Al igual que los prados de siega de baja altitud precisan de la siega y el riego estival para mantenerse.

Prados xeromesofíticos

Aparecen estas formaciones en las zonas más orientales del territorio, en ubicaciones sin posibilidad de riega ocupando un espacio ganado a robledales del sector orensano-sanabriense *Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum* y robledales galaico-portugueses de *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica* generalmente en terrenos con pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y sin posibilidad de riego estival.

Se trata de comunidades tipo cerrillares o majadales que son aprovechadas a diente y que en la actualidad están en proceso de desaparición, debido al descenso de la carga ganadera se abandonan progresivamente estos pastos que son colonizados por matorral.

Pastizales de alta montaña

Aparecen en las zonas más altas, por encima de los 1.300 m.s.n.m. sobre terrenos ácidos frecuentemente encharcados donde dominan pastizales de Festuca indigesta, la endémica Festuca granitícola o cervunales de Nardus stricta.

Los pastizales de festuca indigesta eran aprovechados únicamente en las zonas más orientales de la comarca como pastos de verano. Pertenecen a la Clase Festucetea

Indigestae, Orden Festucetalia Indigestae, Alianza Teesdaliopsio-Luzulion Caespitosae, As. Teesdaliopsio Confertae-Festucetum Summilusitanae.

Los cervunales pertenecen a la Clase Nardetea Strictae, Orden Nardetalia strictae, *Alianza Violion caninae.* Son en general comunidades dominadas por *Nardus stricta* pero con mayor diversidad apareciendo las siguientes especies: *Avenula lodunensis, Campanula herminii, Carex asturica, Jasione montana, Juncus squarrosus, Luzula campestris* subsp. *carpetana, Merendera pyrenaica, Meum athamanticum, Narcissus asturiensis, Narcissus bulbocodium, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica, Plantago alpina, Poa legionensis, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Serratula tinctorea* subsp. *seoanei, Thymelaea dendrobryum, Trifolium alpinum.*

PASTOS ARBUSTIVOS

Brezales secos europeos

Se encuentran en las zonas bajas y de media montaña, según el piso ocupado y las condiciones climáticas de la zona podemos encontrar los siguientes subtipos:

- Brezales submontanos de *Vaccinium* y *Calluna*.
- Brezales subatlánticos de *Calluna* y *Genista*.
- Brezales atlánticos de *Erica* y *Ulex*.
- Brezales ibero-atlánticos de *Erica, Ulex* y *Cistus*.

En todos los casos se trata de comunidades densas de plantas leñosas de porte arbustivo que se desarrollan sobre suelos bien drenados formados a partir de materiales silíceos. Presentan un aspecto y talla variable (0,5-3 m) en función de variables climáticas y edáficas y de su estadio dinámico. En la mayor parte de los casos están dominados por especies leñosas de las familias Ericaceae (*Erica arborea, Erica australis, Erica cinerea, Erica scoparia, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Vaccinium myrtillus*) y Fabaceae (*Cytisus commutatus, C.multiflorus, C. striatus, C. scoparius, Genista florida, G. falcata, Pterospartum tridentatum, Ulex europaeus, U.gallii, U. minor U. micranthus*).

Dentro de este grupo podemos ubicar asociaciones pertenecientes a la CLASE CALLUNO-ULICETEA, Orden Ulicetalia minoris y a la CLASE CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI, Orden Cytisetalia scopario-striati.

Brezales húmedos

En la comarca aparece este tipo de pastos en zonas llanas y mal drenadas en las que se produce un encharcamiento frecuente, en ubicaciones de mayor altitud llega a intercalarse con los pastos de *Nardus stricta* (cervunales).

Florísticamente domina en las zonas más bajas *Erica ciliaris* dominando en las zonas altas del norte y este del territorio *Erica tetralix.* En cuanto a las especies acompañantes destaca la abundancia de musgos *Sphagnum spp.* otras especies presentes son *Calluna vulgaris, Carex panicea, Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica cinerea, Erica mackaiana ,Erica tetralix, Genista anglica, Genista berberidea, Genista micrantha, Juncus squarrosus, Myrica gale, Nardus stricta, Scirpus germanicus.*

Podemos enclavar este tipo de hábitat dentro de la CLASE CALLUNO-ULICETEA, Orden Ulicetalia minoris.

PASTOREO Y MANEJO DE PASTIZALES

En la actualidad la práctica de la ganadería extensiva se encuentra en fase de recuperación debida al éxito de ciertas experiencias cooperativas y la demanda que la carne ecológica producida con razas autóctonas tiene en los mercados.

Para explicar el manejo de estas explotaciones extensivas actuales necesitamos conocer el manejo tradicional que se realizó en el territorio a lo largo de la historia y las causas que ocasionaron su declive.

ORGANIZACIÓN SOCIAL TRADICIONAL

Centraremos este estudio en una zona concreta de la comarca: la mitad norte del valle del Támega comprendida entre la aldea de Vilela (Verín) muy próxima a la capital comarcal que tomaremos como límite sur y el límite norte del valle en Tamicelas (Laza) abarcando un área de unas 5.500 has de superficie atravesada longitudinalmente por el río Támega.

Se trata de un territorio con una gran superficie de prados de ribera (Veigas) situados en las zonas próximas a los numerosos cursos fluviales y zonas de ladera pobladas de comunidades arbustivas.

Predomina en la zona la concentración de la población en núcleos de tipo compacto aunque de pequeño tamaño y compleja organización. La unidad organizativa básica es la parroquia que concentra un número variable de aldeas que a su vez pueden estar divididas en barrios o lugares.

Cada aldea o lugar abarca un territorio definido concentrándose dentro de él dos tipos de propiedad: la propiedad familiar (perteneciente a una casa) y la propiedad comunal. La propiedad comunal puede ser de distinto grado así un terreno puede ser propiedad exclusiva de los vecinos de determinada aldea que además comparten la propiedad de otros terrenos con el resto de vecinos de la parroquia.

Hasta los años cincuenta del pasado siglo el territorio era aprovechado de una manera intensiva sucediéndose los pastizales con zonas de cultivo (labradío) y estos con zonas de pastos arbustivos según nos alejamos de las riberas del valle y entramos en las laderas. La zona estaba intensamente habitada unos 1.800 vecinos (sobre 7.000 habitantes) y con una media de 3-4 cabezas de vacuno por vecino.

Una sociedad cooperativa, unida por la propiedad comunal y por la ritualización de la vida cotidiana[1] se encargaba de gestionar el aprovechamiento del territorio.

Todas las decisiones concernientes a la comunidad debían ser aprobadas por mayoría en concello (concejo abierto). En el concello participaban todos los vecinos (una persona por casa sin distinción por sexo) se celebraba en un lugar fijo siempre al aire libre y de pie.

Esta organización comunitaria era sustancialmente igualitaria, no obstante existían una serie de figuras con funciones especiales:

El “vigairo”, un cargo designado en concello que recaía en un vecino especialmente apreciado por la comunidad. El vigairo tenía como misión la de coordinación de la comunidad. Avisaba a concello usualmente haciendo sonar un cuerno de vaca (luego una corneta metálica, campanas…) que le era entregado en el momento de su designación, una vez reunido el concello introducía el tema o temas a tratar y terminada la votación se encargaba de velar por el cumplimiento de las decisiones alcanzadas. En la toma de decisiones contaba como un vecino más. Era función del vigairo la resolución de

[1] Esta ritualización abarcaba todas las facetas de la vida del individuo: desde los trabajos hasta los juegos, relaciones personales, fiestas…etc.

conflictos por lo que en caso de no haber acuerdo o existir posturas enfrentadas entre familias debía encargarse de realizar discretas visitas a las casas en las que intentaba acercar posturas de cara a la reconciliación de las partes enfrentadas y a evitar posibles polémicas el día del concello.

La "xunta de veciños" o "xunta do pobo" era constituída por un grupo de cuatro o cinco vecinos de edad avanzada con prestigio y experiencia reconocidos. Esta xunta de vecinos exponía su opinión acreditada ante el concello y ejecutaba ciertas decisiones concretas como la selección y delimitación de zonas esquilmar o la determinación del momento óptimo para abrir un pastizal. También representaba al concello en reuniones de varias aldeas para planificar obras en común (caminos, puentes…), negociar acuerdos (lindes…)…etc.

ORDENACIÓN SILVOPASTORAL

El manejo del ganado se realizaba tradicionalmente en un sistema de semiestabulación. Las vacas salían a diario a los pastizales, pero durante las noches y en días especialmente adversos eran mantenidas en los establos o "cortes" situados en la planta baja de la vivienda familiar. El espacio ocupado por el ganado mayor estaba únicamente separado del que ocupaba la familia por un piso de tablas de este modo el ganado funcionaba también como sistema de calefacción.

La mayor parte del territorio ocupado por pastizales permanentes de siega es propiedad comunal, grandes extensiones a lo largo de las riberas que constituyen las llamadas Veigas. Dichas veigas eran aprovechadas de la siguiente forma:

Las Veigas eran aprovechadas a diente por el ganado de los vecinos a excepción de la conocida como Veiga do Boi (destinada a alimento del semental o sementales de propiedad comunal) y del "meiral" o "meirales": parcelas que se cerraban al común de los vecinos para ser subastadas para su siega por parte de uno o varios vecinos que se unían para adquirir los derechos, el beneficio de esta subasta era destinado a sufragar bienes para la comunidad (obras públicas, reparaciones en la iglesia, fiestas patronales…).

La parte aprovechada a diente se cerraba al pastoreo en marzo o abril para abrirse de nuevo a principios del verano, la fecha exacta era decidida por la junta de vecinos. En algunas aldeas se cerraban también las veigas en los meses de otoño en los que eran aprovechados a diente los prados particulares; éstos eran dedicados a producción de

heno siendo costumbre en la zona aprovechar dos siegas (normalmente junio y agosto) y el pasto de otoño a diente.

Los pastos arbustivos se situaban en los terrenos comunales de ladera y se aprovechaban mediante el sistema conocido como “meiras”. Las meiras eran suertes en las que se dividía una determinada parcela del monte, cada una de estas suertes era adjudicada a un vecino por un periodo que iba, según los casos, de uno a tres años. Durante ese tiempo se realizaba el esquilme del matorral para cama del ganado y el aprovechamiento de los brotes a diente en primavera. La zona del monte en que se realizaban los aprovechamientos era decidida también en concello así como el reparto de meiras que eran sorteadas no pudiendo tocarle a un mismo vecino la misma parcela en dos sorteos consecutivos[2].

Una decisión importante a tomar en concello era la de la adquisición de un boi[3] (semental) para lo que cada vecino debía aportar en relación al número de vacas que poseyera. La manutención del boi era otra decisión a tomar en concello, lo más usual es que se un vecino se hiciera cargo de los cuidados del semental por el periodo de un año, durante ese año recibirá una compensación por monta a pagar por el dueño de la vaca. El Boi tiene también sus veigas propias de las que se hace cargo el vecino que lo mantiene.

La propiedad del ganado también contaba con varias peculiaridades, una era la conocida como “vaca a medias” y consistía en el préstamo de una vaca a un vecino necesitado o pareja joven para aprovechamiento de la leche y el trabajo pero con obligación de entregar el ternero al dueño del animal. Otra era conocida como “xogada a medias” y consistía en que dos vecinos, cada uno con una sola cabeza en propiedad, se turnaban para utilizar la pareja para los trabajos más pesados.

[2] Como curiosidad, para ilustrar el empeño que se ponía en la uniformidad de las distintas suertes tanto en superficie como en características, cabe citar un caso en el que en la aldea de Vilaza se dividió una parcela de ladera en trescientas cincuenta franjas paralelas de unos cinco metros de ancho por más de ciento cincuenta de largo.

[3] En lengua gallega la palabra “boi” designa tanto al macho castrado como al entero. De ser necesario enfatizar la diferencia entre ambos conceptos deberíamos referirnos a “boi manso” o “boi bravo”.

Otra de las fuentes de cohesión social era el trabajo cooperativo. Tanto en las parcelas comunales como en las familiares, los trabajos señalados eran realizados de manera cooperativa por toda la comunidad.

Especial significación tenía la siega que se celebraba como una fiesta con unos cantos específicos para cada trabajo y en ocasiones con músicos profesionales que tocaban mientras estos eran realizados. La mayoría de hombres y mujeres colaboraban en la recogida de hierba y la carga de esta en los carros, la siega era realizada por una cuadrilla de expertos en el manejo de la guadaña "gadañadores" y sobre todo en su mantenimiento "crabuñar" cada segador portaba un equipo de mantenimiento consistente en un pequeño yunque "bigornia" a forma de clavo grande que clavaba en el suelo, luego sobre él iba golpeando la hoja con un pequeño martillo hasta crear un filo fino, para terminar se daban unas pasadas con la piedra de afilar que se portaba colgada al cinto dentro de un cuerno de vaca (ver imagen 3).

Asociado a la siega de los prados estaba el juego de "A Porca" o "Xogo da Moca" que se practicaba en los prados tras la siega con una bola de torgo (raíz de brezo). Dos equipos golpeaban la bola con palos de cabeza engrosada (mocas) intentando introducirla en unos hoyos practicados en el suelo. Era un juego sin reglas en el que participaban ambos sexos y en el que el contacto corporal era más que frecuente.

La realización de las tareas comunitarias en relación con la música y con actividades lúdicas servía para cohesionar más la sociedad.

En el caso de trabajos prestados por los vecinos para beneficio de una casa, ya fueran en forma de "xeiras" (jornadas) o de "carrexas" (transporte con carro) estos no eran remunerados ni contabilizados al existir la seguridad de que serían devueltos de la misma manera en caso de ser necesario. Es más, para cada tipo de trabajo estaba ritualizada una compensación simbólica a los participantes en forma de banquete, bien almuerzo, cena, en muchos casos incluso el menú estaba predeterminado según la tarea a acometer.

MANIFESTACIONES ASOCIADAS A LA CULTURA GANADERA.

El Entroido

Una de las manifestaciones de la cultura popular de la comarca de estudio que más destacan por su singularidad es la fiesta del "Entroido" (carnaval), con ciertas diferencias

entre aldeas el ciclo de la fiesta comienza con la entrada del año nuevo para terminar el miércoles de ceniza.

En toda la zona norte del valle del Támega y aldeas de la montaña norte la máscara más típica de esta fiesta es el cigarrón o peliqueiro, que se viste con un traje de vivos colores y complicada confección, se toca con una máscara compuesta de careta en madera de aliso, mitra metálica decorada con imágenes de animales, plantas o astros, y parte trasera cubierta con una piel (gato, zorro o gineta). Porta en la mano derecha la “tralla o zamarra” látigo o fusta con mango de madera y badana de piel de vaca rellena de trapos y en el cinturón seis grandes cencerros. En la fiesta del Entroido representa el máximo poder, es intocable y se abre paso entre la multitud a golpes de látigo.

Su aparición en el carnaval es relativamente reciente teniéndose noticias de su carácter anterior de tipo ceremonial, existen documentos que narran en el siglo XVI la salida de los cigarrones encabezando una procesión por el valle para rogar por el fin de las lluvias prolongadas.

Otra de las facetas del carnaval tradicional que ponen de manifiesto el marcado carácter ganadero de la cultura local es la figura de “A Morena” una vaca de madera dentro de la que se esconde un vecino y que representa la llegada de la primavera. En Laza la morena baja del barrio de Cimadevila la tarde del lunes de carnaval acompañada de numerosos mozos que portan ramas de tojo y sacos llenos de hormigas que arrojan a la multitud que aguarda en la plaza de A Picota. La morena embiste a los congregados intentando levantar con sus cuernos las faldas de las mujeres mientras sus acompañantes le hacen sitio a golpe de tojo. Tradiciones muy similares se conservan por todo el valle: en Tamicelas son dos las morenas, en Feces de Abaixo los acompañantes de la morena ensucian a los parroquianos con cenizas, en otras localidades se arroja harina…etc.

Otras manifestaciones culturales

El “Boi do pobo”, semental propiedad de la aldea era considerado como un símbolo de la misma. Así era costumbre en determinados momentos del año marcados por ciertas romerías que se reunieran en determinado lugar los vecinos de varias aldeas de la misma o distinta parroquia, cada aldea con su animal. Se celebraban las llamadas “Chegas de Bois” luchas entre dos animales dentro de un círculo en las que vence el que obliga al otro a salir del mismo. Esta tradición continúa viva en las montañas del sur de la comarca a

ambos lados de la frontera con Portugal aunque hoy los animales son propiedad de particulares.

MANEJO DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL PASTIZAL

Tradicionalmente los recursos obtenidos en la siega eran secados al sol y almacenados en forma de heno.

Esto presenta problemas de secado en algunas zonas de gran producción, con mucha humedad y ubicaciones de umbría. En esas zonas se introducía el ganado a principios de la primavera realizando un primer aprovechamiento a diente, luego se retiraba y se dejaba crecer el pasto. De esta manera se realizaba una única siega a mediados del verano en la época más caliente y con pasto de menor altura lo que facilitaba el secado del mismo.

El recurso forrajero más utilizado tradicionalmente para el alimento del ganado en los periodos de estabulación era el nabo, en su almacenamiento tiene lugar una fermentación láctica muy similar a la que se produce en el ensilado del heno.

El ensilado en su sentido estricto no aparece en la comarca hasta la transformación del sistema tradicional con la llegada en los años 60-70 del siglo pasado de las razas exóticas (principalmente frisona y pardo-alpina) que, al no poder aprovechar los pastos arbustivos necesitaban, estabulación en los meses de invierno con un mayor aporte de alimento, que se proporcionaba con maíz forrajero.

En el sistema tradicional los periodos de estabulación eran casi inexistentes, solo algún día de invierno especialmente adverso por nevadas intensas quedaba el ganado en el establo el resto del año salían a pastar. La rusticidad de las razas aprovechadas y su extraordinaria adaptación al medio permitía este sistema.

CURIOSIDADES Y VARIANTES DEL SISTEMA.

En las zonas de montaña los pastizales de ribera son muy pequeños o no existen, los pastizales comunales son conocidos como “Lamas” prados que se encuentran en zonas más o menos llanas del monte y con posibilidades de riego. En estas aldeas el sistema de aprovechamiento era muy similar.

En las zonas de mayor altitud y con peores condiciones en las que los pastos herbáceos eran escasos se combinaba el aprovechamiento del vacuno con ganado menor, principalmente cabras aunque también ovejas. En estos casos funcionaba la “Veceira”

sistema en el que según el número de cabezas que poseyera cada casa, le correspondían un número de días al año en que pastorear el rebaño de la aldea.

Otra variante local la tenemos en el núcleo de Medeiros (Monterrei) en el que toda la aldea se dedicaba a la producción y venta de yuntas de bueyes para trabajo. El sistema consistía en comprar parejas de terneros machos que eran castrados y adiestrados para el trabajo conjunto, existían verdaderos expertos en sicología animal que emparejaban los bueyes según temperamento y fuerza. Una vez la yunta estaba formada y adiestrada era vendida. El mercado más habitual era el País Vasco hasta donde se enviaban en tren desde la estación de A Gudiña.

CULTIVOS FORRAJEROS

El cultivo forrajero más utilizado tradicionalmente en la comarca es el nabo. Los nabos eran recogidos y almacenados para ser utilizados como complemento durante el invierno, una vez lavados y cocidos se proporcionaban en el establo.

En inviernos especialmente duros en los que debido a nevadas intensas las vacas no podían salir al pasto durante días al puchero se agregaban además de nabos, calabaza y harina de maíz o centeno.

En zonas de prados xero-mesofíticos se afrontaba la escasez de pastos en verano con el aporte de ramas de fresno (Fraxinus angustifolia) y Olmo (Ulmus glabra).

En Vilaza (Monterrei), O Rosal (Oímbra) y otras zonas de hacia el sur del valle existen prados de ribera y producción de vino en las laderas soleadas (D.O. Monterrei). En estas zonas era usual introducir el ganado en las viñas una vez acabada la vendimia para que se alimentaran de las hojas de la vid.

En épocas recientes se ha cultivado maíz forrajero. En la actualidad el escaso número de cabezas que aprovechan las superficies de pastos y la existencia de piensos comercializados han reducido el uso de cultivos forrajeros.

RAZAS AUTÓCTONAS

Las razas autóctonas empleadas en la comarca varían entre las zonas de valle y las de montaña y entre las montañas orientales y occidentales.

Así en el valle se utilizaban las razas de mayor porte, Limiá, Rubia Gallega y sobre todo la Verinesa, raza que no ha podido ser recuperada, se cree que por sus características similares a las de la raza Limiá acabó fusionándose con esta.

En las zonas montañosas se utilizaban vacas de menor tamaño y mayor rusticidad: el ecotipo de montaña de la Limiá y Cachena en la zona occidental (Sierra de Larouco y alrededores) y Vianesa al norte y Frieiresa en las montañas orientales (Penas Ceibes, Riós y As Frieiras).

Todas estas razas tienen en común su adaptación al medio y un triple aprovechamiento: Leche, carne y trabajo.

RUBIA GALLEGA.

La expansión de la rubia gallega tuvo lugar a mediados del siglo XIX, más concretamente desde 1840 cuando comenzó un intenso comercio de carne hacia las islas británicas en la que la comarca de Monterrei tuvo un especial protagonismo por su carácter fronterizo al ser punto de salida de reses hacia los puertos de Vigo y Oporto. Dicha época de oro de la exportación de carne a través del atlántico vio su fin progresivo a finales de ese siglo con la generalización del uso de buques congeladores que permitían a Gran Bretaña abastecerse de carne en puntos lejanos como el continente americano, Australia o Nueva Zelanda.

Características: gran porte, gran morfología, carne sonrosada, peso de los animales adultos: 750 kg las hembras y 1200 kg los machos peso de los terneros al sacrificio: hembras 190 kg/canal, machos 250 kg/canal. Calificación morfológica: R -U –E (Ilustración 5)

El censo actual en Galicia de vacas reconocidas bajo la denominación Rubia Gallega supera las 26.000, lo que supone un 6,2% de las razas bovinas autóctonas de todo el Estado español, según datos de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega (Acruga). Sus ejemplares tienen un gran desarrollo muscular y por tanto sus terneros un gran rendimiento cárnico y una excelente morfología y calificación.

MORENAS

Las conocidas como morenas gallegas son cinco razas autóctonas originarias de la provincia de Ourense y caracterizadas por su rusticidad y adaptación al medio en la montaña del interior de Galicia. (Ilustración 6)

A estas cinco razas habría que añadir una sexta: la raza Verinesa, más adaptada a las zonas de valle, que no se ha podido recuperar y que tuvo su zona de origen en el espacio que queda entre las razas Frieiresa y Limiá.

Limiá

Gran formato, hipermétrica. Capa castaña oscura sobre todo en el tercio anterior. Peso medio al nacimiento de 32.76 Kg (Machos), y 30.94 Kg (Hembras). Destaca por su gran porte, mansedumbre y por su condición de buena nodriza. Peso de los animales adultos: 650 kg las hembras 900 kg los machos peso de los terneros al sacrificio: 210 kg/canal. Calificación morfológica: R-O (Ilustración 7)

Antaño esta raza fue explotada por su triple aptitud: trabajo, carne y leche, con una orientación mayor a la producción de trabajo. Destaca el ecotipo del valle de las demás razas autóctonas por su tamaño. En la actualidad, su aprovechamiento se dirige exclusivamente a la producción de carne, producción en la que sobresale de las demás al conseguir terneros de mayor peso en el nacimiento y en la desteta, y por su buena producción lechera e importante capacidad maternal. La facilidad de parto hace que sea muy aprovechable para cruce industrial con otras razas más precoces.

Cachena

Características: Pequeño formato, (elipometrica), gran cornamenta en lira alta. Gran rusticidad. Peso medio al nacimiento de 18.38 Kg (Machos) y 17.71 (Hembras) fácil parto. Peso adultos; 350 kg hembras, 550 kg machos. Pesos de los terneros al sacrificio: 130 kg/canal. Calificación morfológica: O. (Ilustración 8)

Son reproductoras con muy buenas calidades maternales, gran facilidad de parto, favorecido por el reducido peso del becerro en el nacimiento (sobre los 17 Kg), y con una aceptable producción lechera que le permite amamantar las crías incluso a desteta. Fuerte instinto maternal, defendiendo bien la descendencia de posibles ataques de los lobos mediante un comportamiento etológico que consiste en dejar los becerros en el centro de un cerco formado por una red de cabezas y cuernos. Esta raza, era antiguamente de triple aprovechamiento: trabajo, carne y leche, con predominio del

primero para los trabajos agrícolas (bueyes). Hoy se usa como productora de una carne de excelente calidad. La venta más frecuente es al destetar los becerros, con un peso de 70-90 Kg/canal, o bien criarlos como novelos, con un rendimiento a canal del 55%.

Destaca su adaptación al medio por su alto grado de transformación de alimentos groseros lo que permite en zonas de montaña un gran aprovechamiento de pastos arbustivos.

Las dosis seminales de esta raza se destinan en la actualidad, a la parte de la reproducción en pureza racial, al cruce industrial mediante la inseminación artificial en razas de producción láctea y cárnica y como semental de elección en la primera inseminación en terneras, lo que proporciona facilidad de parto en la primera gestación.

Su expansión es actualmente por toda Galicia. Hoy la suma de las explotaciones de A Coruña y Lugo superan a las de Ourense. Media de 18,45 cabezas/explotación.

Caldelá

No es una raza propia de la comarca de estudio pero sí limítrofe por el norte.

Características: Única con capa negra, principalmente en cabeza y cuarto delantero con listón característico en la línea dorso-lumbar. Crías color oro con punta del rabo negra. Peso medio al nacimiento de 29.21 Kg (Machos) y 28.18 Kg (Hembras)

Tremendamente rústicas para la cría en libertad, fortaleza, buenas nodrizas. Peso de los animales adultos: 550 kg las hembras 700 kg los machos. Peso de los terneros al sacrificio: 165 kg/canal calificación morfológica: R, O. (Ilustración 9)

La raza tiene un temperamento tranquilo, que conduce a una gran docilidad y a un buen manejo y utilización para el trabajo. Sin embargo, su interés se centra en la reimplantación en las sierras del macizo central orensano, como raza rústica para el aprovechamiento de los recursos pasteros de alta montaña y la producción de un ternero de gran calidad natural que puede llegar a la desteta con 150 Kg/canal, no siendo extraña también una comercialización más tardía con unos rendimientos superiores al 50%.

No es una raza productora de carne cuantitativamente, sino cualitativamente. La raza en pureza se orienta a una producción de carne, bajo los objetivos de calidad tanto en el producto cárnico como en la manera de obtener esta carne. Así, los esfuerzos en la recuperación de esta raza se basan en la obtención de un producto de calidad que se debe promocionar. Otra vía posible es aprovecharla como raza maternal, debido a su

producción lechera que le permite amamantar las crías incluso a desteta, obteniéndose una cría por cruce industrial con otras razas paternales de muy buen rendimiento cárnico. Este último punto no es conveniente explotarlo hasta lograr recuperar el censo de la raza hasta niveles que eviten el riesgo de extinción.

Frieiresa

Tronco castaño. Capa castaña con pelo largo y abundante característico en el testuz y en el pabellón auricular. Peso medio al nacimiento de 28,60 Kg Machos y 27.60 Kg Hembras.

Parto fácil, buena nodriza, peso de los animales adultos: 600 kg las hembras 800 kg los machos, peso de los terneros al sacrificio: 180 kg/canal. Calificación morfológica: R-O. (Ilustración 10)

La raza presenta buenas características de rusticidad, facilidad de manejo y mansedumbre, lo que la hace muy apreciada para el trabajo agrícola. Es indudable que tuvieron un papel importante en la renta de los ganaderos de la zona. Al desaparecer la necesidad de tracción animal, se reorienta su aprovechamiento como productora de carne de calidad, comercializando los terneros a la desteta.

Vianesa

Características: Capa castaña, con abundante pilosidad en la testuz y en los pabellones auriculares. Peso medio al nacimiento de 28.64Kg (Machos) y 27.92 (Hembras) fácil parto, buenas nodrizas. Pesos de animales adultos; 550 kg hembras 750 kg machos peso de los terneros al sacrificio: 170 kg/canal. Calificación morfológica: R-O. (Ilustración 11)

El sistema de explotación sigue pautas tradicionales, con la fórmula mixta de estabulación durante la fase de tiempo adverso y de pastoreo sobre pastizales, áreas de bosque y matorral. En los últimos años se crearon explotaciones de más de 15 animales en las que la raza Vianesa o bien es exclusiva o bien está en mayoría, lo que facilita de una manera rápida su recuperación.

EXPLOTACIONES EN LA ACTUALIDAD

Luego de un periodo de franco retroceso de la ganadería extensiva, que ha conducido a las razas autóctonas al borde de la extinción (efectiva en el caso de la Verinesa) las nuevas tendencias del mercado que apuesta por la calidad y la singularidad frente a la cantidad, en la actualidad comienzan a aparecer explotaciones de pequeño o mediano tamaño.

Estas explotaciones actuales emplean razas autóctonas en pureza destinadas únicamente a la producción de carne y comercializan sus productos principalmente dentro del propio territorio.

La importancia de estas explotaciones es enorme por razones de distinto tipo:

- Social: fijan población en el medio rural.
- Ambiental: gestionan la vegetación manteniendo bajo el riesgo de incendio en el territorio.
- Ecológica: recuperan unas razas de ganado autóctono en peligro de extinción.
- Económico: al trabajar con un producto de extraordinaria singularidad y calidad intrínseca (saludable, buenas características organolépticas…) tienen una enorme proyección hacia los mercados especializados. Proyección que a día de hoy es potencial dado que no se está aprovechando en toda su medida.

En definitiva constituyen una herramienta determinante para la conservación del paisaje, entendiendo el concepto amplio de paisaje como el resultado de la interacción de una determinada cultura humana con el medio natural que ocupa.

Verín 15 de enero de 2013.

TABLAS

LIMIÁ	2006	2007	2008	2009	2010
CRIADORES	29	35	37	42	41
VACAS	148	215	278	322	389
VACA/CRIADOR	5.10	6.14	7.51	7.66	9.48
CRIADORES MORENAS	283	331	339	360	375
% CRIADORES	10.24	10.57	10.91	11.66	10.93

Tabla 1. Explotaciones Limiá.

LIMIÁ	EXPLOTACIONS REXISTRADAS	VACAS REPRODUCTORAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTAIS EN M.NATURAL	NOVELOS MACHOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	4	28	11	3	11	53
LUGO	11	82	48	5	21	156
OURENSE	24	273	171	20	71	535
PONTEVEDRA	2	6	1	0	2	9
TOTAL.GALICIA	**41**	**389**	**231**	**28**	**105**	**753**

Tabla 2. Censo Limiá.

CACHENA	2006	2007	2008	2009	2010
CRIADORES	122	136	144	159	170
VACAS	1255	1556	1823	2139	2447
VACA/CRIADOR	10.28	11.44	12.65	13.45	14.39
TOTAL CRIADORES	283	331	339	360	375
% CRIADORES	43.11	41.08	42.47	44.16	45.33

Tabla 3. Explotaciones Cachena.

CACHENA	CRIADORES	VACAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTALES EN M.NATURAL	NOVELOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	32	242	158	18	88	506
LUGO	54	611	365	40	193	1209
OURENSE	54	1226	628	59	310	2223
PONTEVEDRA	29	358	196	18	100	672
TOTAL	**169**	**2.437**	**1.347**	**135**	**691**	**4.610**

Tabla 4. Censo Cachena

CALDELÁ	2006	2007	2008	2009	2010
CRIADORES	54	62	57	58	56
VACAS	405	522	606	695	781
VACA/CRIADOR	7.5	8.41	10.63	11.98	13.94
CRIADORES MORENAS	283	331	339	360	375
% CRIADORES CALDELÁ	19.08	18.73	16.81	16.11	14.93

Tabla 5. Explotaciones Caldelá.

CALDELÁ	EXPLOTACIONES REGISTRADAS	VACAS REPRODUCTORAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTALES EN M.NATURAL	NOVELOS MACHOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	1	24	5	0	6	35
LUGO	17	219	136	11	63	429
OURENSE	34	408	207	39	129	783
PONTEVEDRA	4	130	61	7	40	238
TOTAL GALICIA	**56**	**781**	**409**	**57**	**238**	**1.485**

Tabla 6. Explotaciones Caldelá.

FRIEIRESA	2006	2007	2008	2009	2010
CRIADORES	20	26	27	28	31
VACAS	179	209	262	324	360
VACA/CRIADOR	8.95	8.03	9.70	11.57	11.61
CRIADORES MORENAS	283	331	339	360	375
% CRIADORES	7.06	7.85	7.96	7.77	8.26

Tabla 7. Explotaciones Frieiresa

FRIEIRESA	EXPLOTACIONES REGISTRADAS	VACAS REPRODUCTORAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTALES EN M.NATURAL	NOVELOS MACHOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	2	10	6	0	5	21
LUGO	6	65	42	5	22	134
OURENSE	20	243	143	19	53	458
PONTEVEDRA	3	42	32	3	9	89
TOTAL GALICIA	**31**	**360**	**223**	**27**	**89**	**699**

Tabla 8. Censo Frieiresa.

VIANESA	2006	2007	2008	2009	2010
CRIADORES	58	72	74	73	77
VACAS	497	654	755	919	1129
VACA/CRIADOR	8.56	9.08	10.20	12.58	14.66
CRIADORES MORENAS	283	331	339	360	375
% CRIADORES	20.49	21.75	21.82	20.27	20.53

Tabla 9. Explotaciones Vianesa.

VIANESA	EXPLOTACIONS REXISTRADAS	VACAS REPRODUCTORAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTAIS EN M.NATURAL	NOVELOS MACHOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	4	47	33	4	21	105
LUGO	20	181	98	12	50	341
OURENSE	45	794	407	50	214	1465
PONTEVEDRA	8	107	46	7	13	173
TOTAL GALICIA	**77**	**1.129**	**584**	**73**	**298**	**2.084**

Tabla 10. Censo Vianesa.

MORENAS GALEGAS	EXPLOTACIONES REGISTRADAS	VACAS	NOVELAS RECRÍA	SEMENTALES EN	NOVELOS MACHOS	TOTAL CABEZAS
A CORUÑA	43	351	213	25	131	720
LUGO	108	1.158	689	73	349	2.269
OURENSE	177	2.944	1.556	187	777	5.464
PONTEVEDRA	46	643	336	35	164	1.178
TOTAL GALICIA	**374**	**5.096**	**2.794**	**320**	**1.421**	**9.631**

Tabla 11. Explotaciones Morenas Gallegas.

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Equipo de "Crabuñar"

Ilustración 2 Os Peliqueiros. Laza

Ilustración 3. A Morena. Laza

Ilustración 4. Trabajos comunitarios. A Seitura en Flariz.

Ilustración 5. Rubia Galega



Ilustración 6. Distribución de las Morenas Galegas.

Ilustración 7. Limiá.

Ilustración 8. Cachena.

Ilustración 9. Caldelá.

Ilustración 10. Frieiresa

Ilustración 11. Vianesa.

TABLAS

Tabla 1. Explotaciones Limiá. 23
Tabla 2. Censo Limiá. 23
Tabla 3. Explotaciones Cachena. 23
Tabla 4. Censo Cachena 23
Tabla 5. Explotaciones Caldelá. 24
Tabla 6. Explotaciones Caldelá. 24
Tabla 7. Explotaciones Frieiresa 24
Tabla 8. Censo Frieiresa. 24
Tabla 9. Explotaciones Vianesa. 25
Tabla 10. Censo Vianesa 25
Tabla 11. Explotaciones Morenas Gallegas 25

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Equipo de "Crabuñar" 26
Ilustración 2 Os Peliqueiros. Laza 26
Ilustración 3. A Morena. Laza 27
Ilustración 4. Trabajos comunitarios. A Seitura en Flariz. 27
Ilustración 5. Rubia Galega 28
Ilustración 6. Distribución de las Morenas Galegas 28
Ilustración 7. Limiá. 29
Ilustración 8. Cachena. 29
Ilustración 9. Caldelá. 30
Ilustración 10. Frieiresa 30
Ilustración 11. Vianesa 31